

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE  
CONCURSO PÚBLICO**

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO**



**DIA - 20/12/2009**

**CARGO: CIRURGIÃO PLÁSTICO**



UNIVERSIDADE FEDERAL DE  
CAMPINA GRANDE



**GABARITO RASCUNHO**  
**CONCURSO HUAC - 2009**

1.	16.
2.	17.
3.	18.
4.	19.
5.	20.
6.	21.
7.	22.
8.	23.
9.	24.
10.	25.
11.	26.
12.	27.
13.	28.
14.	29.
15.	30.

## CURUGIÃO PLÁSTICO

01 - Os acontecimentos mais comuns em cirurgia plástica geral são as lesões de pavilhão auricular) Desta forma, pode-se dizer que as seguintes estruturas fazem parte das reparações do pavilhão auricular:

- a) ligamento de valsalva.                      b) músculo auricular superior.                      c) músculo do trago.  
d) nervoso auriculotemporal.                      e) todas as alternativas anteriores fazem parte das reparações.

02 - Segundo a classificação de Simon, Hoffman e Kahn, (1973) a quantidade de pele e tecido mamário, para tratamento de ginecomastia é considerado em:

- I) grau I: pequeno aumento mamário sem excesso de pele.  
II) grau II A: aumento moderado da mama sem excesso de pele.  
III) grau II B: aumento da areola com excesso de pele.

Assinale a alternativa correta:

- a) II e III.                      b) I e II.                      c) I e III.                      d) I.                      e) I, II e III.

03 - Em relação as pálpebras pode-se afirmar:

- a) tarso e conjuntiva formam a camada posterior das pálpebras.                      b) músculo suspensor do olho.  
c) músculo orbicular faz parte do processo palpebral.                      d) músculo redondo oblíquo interno do olho.  
e) músculo tireoglossos.

04 - Faz parte da técnica de implante mamário as seguintes vias e lojas:

- a) via axilar e implante sub muscular.                      b) implante sub facial.                      c) implante sub glandular.  
d) via pr.                      e) todas as alternativas estão corretas.

05 - Pode-se considerar durante um exame de rotina, físico, pré-operatório e ou clínico, como dermatoses pré cancerígenas freqüentes:

- a) Doença de Bowen.                      b) Doença de Paget.                      c) Queilite actínica.  
d) Queratose solar.                      e) Todas as alternativas estão corretas.

06 - Em relação à isquemia de Volkman pode-se afirmar que

- a) não existe compreensão da estrutura nervosa.                      b) não existe necessidade de fasciotomia.  
c) não existe risco de perdas de membro.                      d) não existe compressão muscular.  
e) todas as alternativas estão incorretas.

07 - O que é uma fissura palatina?

- a) É a falha de duas metades do teto da boca de se unir e fusionar na linha média.  
b) É a falha de duas metades do teto da boca de se unir e fusionar na pré-maxila.  
c) É uma deformidade morfológica plagiocefalia.  
d) É uma deformidade morfológica oxicefalia.  
e) Nenhuma das anteriores.

08 - Qual o tratamento para anquilose fibróssea entre o arco zigomático e o processo coronóide de mandíbula após fratura de zigoma?

- a) Meniscectomia.                      b) Meniscectomia e coronoidectomia.                      c) Coronoidectomia.  
d) Maxilectomia, coronoidectomia e condilectomia.                      e) Todas essas técnicas são inapropriadas.

- 09 - Onde está a linha de maior tensão em um retalho de rotação?
- O retalho de rotação não tem linha pivotante.
  - A linha de maior tensão se estende do ponto pivô do retalho à borda do defeito mais próximo de onde o retalho previamente estava.
  - A linha de maior tensão se estende do ponto pivô do retalho à borda do defeito mais distante de onde o retalho previamente estava.
  - A linha pivotante depende do tamanho do retalho de rotação.
  - Nenhuma das opções acima responde à questão formulada.
- 10 - De acordo com classificação dos retalhos musculares quanto ao seu suprimento vascular, segundo Nahai e Mathes, podemos afirmar que o músculo Serrátil Anterior é do tipo:
- I.
  - II.
  - III.
  - IV.
  - V.
- 11 - Paciente com trauma extenso de pé com grande perda de substância, exposição da articulação tíbio-tarsica e porção cutânea plantar) A melhor indicação para tratamento é:
- Reparação com enxerto de pele total.
  - Reparação com retalhos cutâneos locais e enxerto de pele.
  - Retalho cruzado de perna e enxerto de pele.
  - Retalho livre microcirúrgico.
  - Nenhuma das respostas.
- 12 - Qual é o pedículo vascular do músculo "latissimus-dorsi"?
- Artéria torácica lateral.
  - Artéria tóraco - dorsal.
  - Artéria tóraco - acromial.
  - Artéria torácica interna.
  - Artéria torácica externa.
- 13 - Um paciente, 24 horas após uma lipoaspiração de abdome e quadris, mostra-se confusa e um pouco desorientada) Ela tem exantema petequial nos ombros e no tórax anterior) Indique o diagnóstico mais provável:
- Reação alérgica à medicação.
  - Embolia gordurosa.
  - Septicemia.
  - Anemia.
  - Rubéola.
- 14 - Com relação às características dos queratoacantomas, assinale a alternativa INCORRETA:
- Histologicamente assemelha-se a carcinomas de células basais.
  - Apresentam crescimento rápido nas primeiras semanas.
  - Consistem em um nódulo circundando uma "rolha" queratinosa.
  - Apresentam resolução espontânea cerca de seis meses após o seu aparecimento.
  - Apresentam aumento progressivo após a primeira semana de aparecimento.
- 15 - A cicatriz queloidiana ( Quelóide verdadeiro), após excisão e sutura simples, sem nenhum tratamento complementar:
- Nunca recidiva.
  - Recidiva só nos negros.
  - Sempre recidiva.
  - A recidiva é mais atenuada.
  - Só recidiva nos nórdicos.
- 16 - A diplopia é sinal patognomônico da fratura por:
- Desvio da pirâmide nasal.
  - Afundamento dos ossos nasais.
  - Afundamento do zigomático.
  - Deslocamento do zigomático.
  - Afundamento do maxilar.
- 17 - As técnicas de cirurgia estética na ptose mamária procuram a forma através de:
- Retirada de cirurgia estética do pólo inferior da mama.
  - Inclusão de prótese de silicone.
  - Retirada de tecido + inclusão de prótese.
  - Retirada de tecido + confecção de retalho dermogorduroso da região infra-mamária.
  - Todas as alternativas estão corretas.

18 - Nas mamoplastias redutoras, a manobra de Schwartzman tem como objetivo principal:

- a) Evitar a necrose do complexo aréolo-mamilar, garantindo viabilidade circulatória.
- b) Dar uma melhor forma a mama operada.
- c) Preservar a função de lactação.
- d) Facilitar a recolocação do mamilo.
- e) Nenhuma das respostas.

19 - Caracteriza-se pela presença de colágeno, proteína insolúvel, sendo composto principalmente de glicina, prolina e hidroxiprolina) Para sua formação requer enzimas específicas que exigem co-fatores como oxigênio, ferro, ácido ascórbico) Daí suas deficiências levarem ao retardo da cicatrização) Trata-se de qual fase da cicatrização?

- a) Fase inflamatória.
- b) Fase de epitelização.
- c) Fase celular.
- d) Fase de fibroplasia.
- e) Fase de quimiotaxia.

20 - Os músculos oponente do polegar, abdutor curtado polegar e I e II lumbricais são inervados pelo nervo:

- a) Radial.
- b) Mediano.
- c) Interósseo dorsal.
- d) Ulnar.
- e) Nenhuma das respostas anteriores.

21 - Paciente adulto, na emergência com queimaduras nas coxas, genitália e no membro superior esquerdo) Aplicando a regra dos nove para o cálculo da superfície corporal queimada, encontramos que valor?

- a) 36.
- b) 21.
- c) 28.
- d) 54.
- e) 32.

22 - O tratamento mais indicado para um paciente de 60 anos, com carcinoma basocelular primário de ponta do nariz é?

- a) Crioterapia.
- b) Laser.
- c) Se o carcinoma basocelular for < 20 mm, 3mm das margens periféricas removerão o tumor em 95% dos casos.
- d) Excisão cirúrgica com avaliação das margens laterais e profundas.
- e) Nenhuma das respostas.

23 - Assinale a alternativa correta relacionada aos fatores que influenciam a cicatrização:

- a) O elemento zinco é um co-fator em reações enzimáticas e tem pouca influência na má-cicatrização.
- b) A desnutrição altera a cicatrização somente por causar a hipoalbuminemia, não tendo relação com carências vitamínicas.
- c) Os corticóides alteram a cicatrização por inibirem a fase inflamatória, a epitelização e a síntese de colágeno.
- d) O processo infeccioso provoca o prolongamento da fase de fibroplasia, levando à formação de quelóide.
- e) A radiação tecidual compromete a cicatrização por interferir na produção do colágeno e estimular a collagenase.

24 - O tempo médio para obtenção de novo enxerto, no mesmo local, após a retirada de um enxerto laminar delgado de pele é de:

- a) 1 semana.
- b) 2 semanas.
- c) 3 semanas.
- d) 4 semanas.
- e) 5 semanas.

25 - A zetaplastia deve ser realizada em cicatriz:

- a) Pigmentada alargada.
- b) Deprimida na linha de força.
- c) Hipertrofica na linha de força.
- d) Retrátil na linha de força.
- e) Queloidiana na linha de força.

- 26) O Qual é o curativo biológico de escolha para cobertura temporária de uma ferida decorrente de queimadura térmica?
- a) Látex.                      b) Metilcelulose.                      c) Pericárdio bovino.                      d) Aloenxerto cutâneo.                      e) Auto-enxerto cutâneo.
- 27) - Utilizamos a "Técnica de Wardill" no tratamento:
- a) Da fissura labial.  
 b) Da fissura palatina.  
 c) Da microtia.  
 d) Da hipertelorismo.  
 e) Da ptose palpebral.
- 28) - Em relação à prevenção de tétano em queimados pode-se afirmar que
- a) o soro antitetânico na dose de 5)000 U é para criança e 10)000 U para adulto.  
 b) a administração de vacina deve ser no momento do acidente, no 15º dia e 30º dia.  
 c) existe a necessidade de administrar complexo B e vitamina C.  
 d) não se infunde proteínas em grandes queimados.  
 e) desbridamento imediato das bolhas.
- 29) - Dentre os diversos fatores que prejudicam a cicatrização está o uso de corticosteróides) Um antídoto à ação do corticosteróide é a administração de
- a) vitamina A.  
 b) vitamina C.  
 c) vitamina D.  
 d) vitamina E.  
 e) vitamina K.
- 30) - Para a reconstrução de uma lesão labial, deve-se conhecer sua formação) Diante disso pode-se afirmar que cada lábio é formado por
- a) porção cutânea e ou face anterior.  
 b) margem vermelha.  
 c) zona vermelha e face posterior.  
 d) músculo orbicular.  
 e) todas as alternativas estão corretas.



