

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
CONCURSO PÚBLICO**

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO



DIA - 20/12/2009

CARGO: INTENSIVISTA ADULTO



UNIVERSIDADE FEDERAL DE
CAMPINA GRANDE



GABARITO RASCUNHO
CONCURSO HUAC - 2009

1.	16.
2.	17.
3.	18.
4.	19.
5.	20.
6.	21.
7.	22.
8.	23.
9.	24.
10.	25.
11.	26.
12.	27.
13.	28.
14.	29.
15.	30.

- 10 - A primeira medida a ser tomada em caso de hipercalemia severa é o uso de:
- a) Sais de cálcio. b) Resina de troca iônica. c) Diurético de alça.
d) Diálise. e) Sais de magnésio.
- 11 - Qual das opções abaixo mostra evidência de melhorar o prognóstico após a ocorrência de parada cardiorespiratória:
- a) Uso de drogas vasoativas. b) Corticoides em altas doses.
c) Sedação profunda com Thioembutal. d) Manitol em infusão contínua por 24 horas.
e) Hipotermia leve.
- 12 - Não é indicação para suporte com balão intra-aórtico:
- a) Choque cardiogênico com isquemia miocárdica presente. b) Insuficiência mitral aguda. c) Comunicação interventricular.
d) Miocardiopatia dilatada idiopática com hipotensão refratária a inotrópicos positivos. e) IAM com choque cardiogênico.
- 13 - Qual dos seguintes parâmetros não precisa ser ajustado no modo ventilatório pressão controlada:
- a) Pressão de suporte. b) Tempo inspiratório. c) Sensibilidade.
d) Fluxo inspiratório. e) N.D.R.
- 14 - O modo pressão de suporte (PSV) é ciclado a:
- a) Volume. b) Fluxo. c) Pressão. d) Tempo. e) Sensibilidade
- 15 - As seguintes entidades clínicas podem ser causas de insuficiência respiratória hipercapnica-hipoxêmica, EXCETO:
- a) Intoxicação por barbitúrico. b) Miastenia gravis. c) Edema pulmonar cardiogênico.
d) Trauma de medula espinhal. e) N.D.R.
- 16 - Na tentativa de cardioversão química de fibrilação atrial recente, em paciente estável hemodinamicamente a medicação menos indicada seria:
- a) Propafenona. b) Quinidina. c) Sotacol. d) Amiodarona. e) Adenosina
- 17 - Em um paciente idoso, diabético, com quadro de meningite bacteriana comprovada por liquor, a antibioticoterapia inicial mais adequada é:
- a) Ceftriaxona I.V. b) Ceftriaxona + Ampicilina I.V. c) Penicilina + Garamicina I.V.
d) Penicilina I.V. e) Garamicina + ampicilina.
- 18 - O choque cardiogênico é definido pelos seguintes parâmetros:
- a) Hipotensão, hipoperfusão e congestão. b) Acidose, hipotensão e P.C.P. normal.
c) Rebaixamento do nível de consciência, acidose e lactato alto. d) P.A.S. < 90 mmhg., oligúria e acidose.
e) N.D.R.
- 19 - Em um paciente cirrótico com ascite, tem que perfil hemodinâmico:
- a) Baixo débito cardíaco e alta resistência vascular periférica.
b) Alto débito cardíaco e alta resistência vascular sistêmica.
c) Alto débito cardíaco e baixa resistência vascular sistêmica.
d) Baixo débito cardíaco e baixa resistência vascular sistêmica.
e) Baixa resistência vascular periférica e baixa perfusão.

- 20 - Qual das medicações abaixo não deve ser usada nos casos de suspeita de infarto do ventrículo direito:
 a) Beta-bloqueadores. b) Nitratos. c) Fibrinolíticos. d) Aas. e) I ECA.
- 21 - Mulher de 18 anos de idade durante flebotomia para coleta de sangue de rotina apresenta quadro de palidez, diaforese seguida de síncope. Qual o diagnóstico etiológico mais provável?
 a) Vasovagal. b) Arritmia. c) Epilepsia. d) Estenose aórtica. e) Estenose mitral.
- 22 - O agente etiológico mais prevalente em infecções valvares em indivíduos com valvas nativas e usuários de droga é(são):
 a) Estreptococo. b) Enterococo. c) Estafilococo. d) Fungos. e) Pseudomona.
- 23 - Com relação a Fibrilação atrial, é correto afirmar:
 a) A digoxina isoladamente deve ser usada para reduzir a F.C.
 b) Na presença de intoxicação digitalica a cardioversão elétrica deve ser usada imediatamente.
 c) Na presença de gravidez a cardioversão elétrica é uma contra-indicação absoluta.
 d) Após 48 horas se não há evidência de trombo pelo ECO transesofágico a cardioversão elétrica pode ser realizada após anticoagulação com heparina não fracionada.
 e) Na presença de neoplasias a cardioversão está contra indicada.
- 24 - Qual o principal determinante da sobrevivência de uma parada cardiorespiratória devido a fibrilação ventricular?
 a) Intubação endotraqueal. b) Desfibrilação. c) Ventilação boca a boca.
 d) Compressão torácica externa. e) Adrenalina intracardíaca
- 25 - O débito cardíaco não depende diretamente do(a):
 a) Retorno venoso. b) Contratilidade. c) Resistência vascular periférica.
 d) Frequência cardíaca. e) Função diastólica do ventrículo esquerdo.
- 26 - Na taquicardia supraventricular, assinale a afirmação INCORRETA:
 a) Não esta associada coma taquicardiomiopatia.
 b) Adenosina é a droga de escolha pra seu tratamento.
 c) O verapamil pode ser útil quando a TPSV esta associada a doença coronariana.
 d) Dependendo de sua etiologia ela pode ser curada.
 e) N.D.R.
- 27 - O implante de marcapasso cardíaco provisório NÃO esta indicado para os casos de:
 a) Parada cardíaca por assistolia.
 b) BAVT congênito.
 c) Bradicardia com baixo débito cardíaco e instabilidade hemodinâmica.
 d) BAVT sintomático na vigência de infarto de parede inferior.
 e) Presença de infarto anterior com bloqueio agudo do ramo direito.
- 28 - Assinale a droga de primeira indicação na arritmia secundaria a infarto agudo do miocárdio:
 a) Lidocaina. b) Propranolol. c) Verapamil. d) Digoxina. e) Amiodarona.
- 29 - A complicação mais comum do I.A.M é
 a) Pericardite. b) Arritmias. c) Tromboembolismo.
 d) Ruptura do músculo papilar. e) Choque cardiogênico.
- 30 - Em um paciente submetido a ventilação mecânica invasiva, qual das medidas adotadas aumenta a oxigenação do sangue?
 a) Aumento do tempo inspiratório. b) Diminuição do volume corrente.
 c) Aumento da frequência respiratória. d) Limitação da pressão de plateau em 35 cmH2O.
 e) N.D.R.

