



Universidade Federal
de Campina Grande

Hospital Universitário

Rua Carlos Chagas, s/n - São José - CEP: 58107 670 - Telefone 0 XX (83) 2101-5500 Campina Grande - PB



Comissão de Processos
Vestibulares



09/02/2014

Médico Cirurgião Pediátrico



Universidade Federal
de Campina Grande

Hospital Universitário

Rua Carlos Chagas, s/n - São José - CEP: 58107-670 - Telefone 0 XX (83) 2101-5500 Campina Grande - PB



PROCESSO SELETIVO - HUAC

09 de fevereiro de 2014

Nível Superior

Médico Cirurgião Pediátrico

GABARITO DO CANDIDATO

1.	11.	21.	31.
2.	12.	22.	32.
3.	13.	23.	33.
4.	14.	24.	34.
5.	15.	25.	35.
6.	16.	26.	36.
7.	17.	27.	37.
8.	18.	28.	38.
9.	19.	29.	39.
10.	20.	30.	40.

Médico Cirurgião Pediátrico

01 Com relação a Fisiologia do Sistema Cardiovascular e de acordo com as assertivas abaixo responda:

- I- O coração dos neonatos tem menos massa muscular contrátil (30% dos adultos).
- II- Nos recém nascidos e lactentes, a hipovolemia revela-se ao contrário dos adultos, por hipotensão sem taquicardia.
- III- A bradicardia ocasionará aumento do débito cardíaco com hipotensão arterial.

Está(ão) correta(s)

- a) Apenas I e II.
- b) Apenas II e III.
- c) Apenas I e III.
- d) Apenas I.
- e) Apenas II.

02 Quais dos fatores abaixo diminuem as necessidades hídricas diárias?

- a) Prematuridade.
- b) Febre.
- c) Uso de diuréticos.
- d) Perdas extras: diarreia, fístulas, queimados, etc.
- e) Ventilação mecânica.

03 O recém nascido apresenta conteúdo de água total elevado chegando a 80% no prematuro, às custas do compartimento extracelular. é FALSO afirmar que:

- a) A água corporal total e o volume extracelular decrescem à medida que a idade progride.
- b) Diante do trauma cirúrgico e com redução do espaço extracelular, há liberação dos hormônios antidiurético, ACTH e T3, além das catecolaminas.
- c) As catecolaminas juntamente com o T3 promovem catabolismo com balanço nitrogenado positivo.
- d) Como o espaço extracelular do RN é o que predomina, são mínimas as reações, exceto se o mesmo for operado com distúrbio hidroeletrólítico.
- e) O recém nascido pré-termo é particularmente mais susceptível a perda de sódio.

04 No pós operatório em Cirurgias Pediátricas, qual das assertivas abaixo não está correta:

- a) Pacientes recém nascidos devem, inicialmente, permanecer na UTI neonatal.
- b) Perdas por sonda gástrica nos casos de peritonite, ressecção intestinal ou ileostomia são repostas através da hidratação.
- c) A deambulação precoce deve ser estimulada naqueles que podem fazê-los.
- d) Nos recém nascidos submetidos à cirurgia abdominal a realimentação é feita inicialmente com dieta líquida de prova em pequenas quantidades.
- e) Acompanhamento mais duradouro é mandatório, especialmente em patologias que requerem seguimento prolongado.

05 De acordo com as assertivas abaixo responda:

- I- A incidência de defeitos congênitos associados à gastroquise é de 40% e os mais frequentes são as malformações cardíacas e as trissomias.
- II- A gastroquise é um defeito congênito da parede abdominal de origem embriogênica.
- III- Na gastroquise o tratamento cirúrgico ideal é o fechamento primário, entretanto, nem sempre é possível, devido a desproporção entre as víceras exteriorizadas e a cavidade abdominal. Nesse casos, o tratamento proposto deve ser a colocação de uma tela impermeável para redução progressiva do conteúdo para cavidade(Técnica do Silo).

Está(ão) correta(s)

- a) Apenas I e II.
- b) Apenas I.
- c) Apenas II.
- d) Apenas III.
- e) Apenas II e III.

06 De acordo com as assertativas abaixo, responda:

- I- O cisto tireoglosso pode se manifestar como um abscesso cervical mediano, com fistulização secundária ou mesmo sofrer degeneração maligna.
- II- O cisto tireoglosso é palpável na linha média do pescoço, é móvel a protusão da linha e a deglutição, devido a sua comunicação com a base da língua.
- III- O tratamento é cirúrgico e consiste na ressecção do cisto e trajeto fistuloso até o osso hioide

Está(ão) correta(s)

- a) Apenas II.
- b) Apenas I e II.
- c) Apenas II e III.
- d) Apenas I e III.
- e) Apenas I.

07 Quanto a definição dos cistos e tumores benignos dos tecidos moles é FALSO afirmar que:

- a) Cistos dermóides são cistos revestidos por epitélio e com variados anexos cutâneos, situados na derme, raramente no subcutâneo.
- b) Lipomas são tumores benignos localizados no subcutâneo, formados por crescimento local excessivo de gordura.
- c) Pilomatrixoma ou tricomaticoma, são tumores benignos da matrix, córtex e bainhos das raízes internas dos cabelos.
- d) Cistos sebáceos, são formados pela distensão da glândula sebácea.
- e) Cistos epidermóides, são cistos de inclusão da epiderme sem anexos da pele ou elementos mesodérmicos.

08 Qual a neoplasia mais comum em crianças com SIDA?

- a) Linfoma de Hodgkin.
- b) Linfoma não Hodgkin.
- c) Hepatoblastoma.
- d) Neuroblastoma.
- e) Rbdomiossarcoma.

09 Qual a causa mais comum de perfuração intestinal neonatal:

- a) Perfuração intestinal espontânea idiopática.
- b) Defeitos congênitos da musculatura intestinal.
- c) Enterocolite necrosante.
- d) Nutrição enteral prolongada.
- e) Catetarismo da veia umbilical.

10 Dentre as anomalias abaixo, qual não está associada a Sequência Pierre-Robin:

- a) Defeitos das extremidades (Sindactilia, polidactilia, etc.).
- b) Defeitos cardíacos (Defeitos Septais, tetralogia de Fallot, etc.).
- c) Defeitos oculares (Estrabismo, miopia, etc.)
- d) Problemas otológicos (Otite média, perda de audição, etc.)
- e) Defeitos congênitos da genitália externa (Hipospádia, epispádia, etc.).

11 Qual o tumor mais comum de células germinativas?

- a) Tumor de seio endodérmico puro.
- b) Carcinoma embrionário.
- c) Teratoma.
- d) Disgerminoma.
- e) Gonodblastoma.

12 Nos Pseudocistos pancreáticos maiores de 5cm, complicados por sangramento, infecção e de evolução prolongada, está indicado tratamento cirúrgico. Em que tipo está indicado a drenagem interna:

- a) Pseudocisto localizado na parede posterior do estômago.
- b) Pseudocisto aderente ao duodeno.
- c) Pseudocisto localizado anteriormente no corpo ou na cauda do pâncreas.
- d) Pseudocistos com pseudocápsula de boa espessura intimamente aderidos a outras estruturas abdominais.
- e) Pseudocisto imaturo de parede fina e friável com conteúdo infectado.

13] A anomalia congênita do aparelho digestivo mais comum é:

- a) Atresia do esôfago. b) Atresia duodenal. c) Atresia do colon.
d) Atresia ileal. e) Anomalia anorretal.

14] Qual a manobra mais segura e eficaz para abrir a via aérea em uma criança vítima de trauma com suspeita de lesão medular:

- a) Projeção anterior da mandíbula com extensão vertical.
b) Deslocamento anterior do maxilar inferior.
c) Aspiração da via aérea superior.
d) Punção cricotireoidea.
e) Uso de cânula orofaríngea ou nasofaríngea.

15] Considerando que em patologias cirúrgicas pediátricas nos deparamos com a desidratação, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) A correção da hiponatremia depende da volemia do paciente e do tempo de instalação do distúrbio.
b) Na desidratação isotônica ocorre perda proporcional de sódio e água, sem alterações na osmolaridade.
c) O mecanismo primário para regulação da volemia envolve a excreção renal de sódio.
d) Na desidratação hipertônica, os sinais de hipovolemia serão marcantes e precoces.
e) Para o cálculo de reposição hidroeletrólítica em pacientes obesos deve-se considerar, como referência, o peso normal para a idade.

16] Com relação a distribuição dos principais tumores abdominais malignos, observados na infância e adolescência por faixa etária (mês/ano), qual das alternativas abaixo não está correta:

- a) 0 a 1 mês - Nefroma mesoblástico
Tumor de Wilms
Neuroblastoma
Hepatoblastoma
- b) 1 a 12 meses - Neuroblastoma
Nefroma
Hepatoblastoma
Tumor de Wilms
- c) 1 a 3 anos - Neuroblastoma
Tumor de Wilms
Hepatoblastoma
Nefroma
- d) 3 a 11 anos - Neuroblastoma
Tumor de Wilms
Hepatoblastoma
Linfoma
- e) 11 anos acima - Linfoma
Nefroma mesoblástico
Hepatocarcinoma
Rabdomiosarcoma

17] Dentre os sinais e sintomas abaixo, qual assertativa NÃO está relacionada com torção do testículo:

- a) Irritabilidade.
b) Edema e hiperemia da bolsa escrotal.
c) Testículo elevado e aumento de volume.
d) Reflexo cremastérico presente.
e) Mais comum no lado esquerdo.

26] No quadro clínico e apresentação do efisema lobar congênito, qual a alternativa é FALSA ?

- a) Desconforto respiratório progressivo no recém nascido.
- b) Em mais de 80% dos casos, manifesta-se no primeiro mês de vida e em 50% dos pacientes logo após o nascimento.
- c) Abaulamento do hemitórax comprometido com desvio do ictus cordis.
- d) Hipertimpanismo à percussão- ausência ou diminuição do murmúrio vesicular.
- e) Em lactentes a dispnéia pode aparecer aos esforços.

27] Na Hérnia Diafragmática de Bochdalek é correto afirmar que:

- a) Incide em torno de 1:50.000 nativos.
- b) Mais freqüente no lado direito-85% dos casos.
- c) Bilateral em 10%.
- d) Anomalias cardíacas estão presentes em 10 a 30% dos pacientes.
- e) Predomina no sexo feminino 5:1.

28] Na Onfalocele é FALSO afirmar que:

- a) É mais freqüente no sexo masculino
- b) 10 a 15% dos pacientes são prematuros ou PIG
- c) O fígado está presente em 2/3 dos casos podendo dificultar o tratamento
- d) O anel herniário tem dimensões variadas implicando no volume de seu conteúdo
- e) A membrana que recobre as alças pode romper durante o parto, determinando evisceração, transformando-se numa emergência cirúrgica

29] M.S.O, sexo masculino, 6 anos de idade, dá entrada na Emergência Pediátrica com queixa de dor na região escrotal direita há mais ou menos 8 horas, irradiação para região inguinal do mesmo lado associado a aumento do volume escrotal sem relato de trauma. No exame nota-se hiperemia e edema escrotal direito, testículo aumentado, doloroso a palpação, transluminação positiva e reflexo cremestérico presente. A hipótese diagnóstica mais provável é:

- a) Torção testicular intravaginal.
- b) Torção testicular extravaginal.
- c) Hematocele.
- d) Orquiepididimite.
- e) Hérnia inguinal direita encarcerada.

30] Menor, 10 anos, masculino, com história de queda da própria altura e trauma abdominal fechado. Apresenta-se com dor abdominal, defesa a palpação, escoriação ao nível do apêndice xifóide, palidez, taquicardia, dor no ombro direito. Há relato de um vômito e desmaio logo após o trauma. A hipótese diagnóstica mais provável é:

- a) Explosão gástrica.
- b) Ruptura do baço.
- c) Ruptura do fígado.
- d) Lesão de pâncreas.
- e) Contusão renal direita.

31 Considerando o conteúdo da Constituição Federal e da lei 8.080 referente à participação da iniciativa privada no SUS, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) As instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
- b) É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.
- c) É livre a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País.
- d) Os serviços privados de assistência à saúde caracterizam-se pela atuação, por iniciativa própria, de profissionais liberais, legalmente habilitados, e de pessoas jurídicas de direito privado na promoção, proteção e recuperação da saúde.
- e) Na prestação de serviços privados de assistência à saúde, serão observados os princípios éticos e as normas expedidas pelo órgão de direção do SUS.

32 De acordo com o Art. 200 da Constituição Federal, compete ao Sistema Único de Saúde, EXCETO:

- a) Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos.
- b) Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.
- c) Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.
- d) Incrementar, em sua área de atuação, o desenvolvimento científico e tecnológico.
- e) Executar a política do meio ambiente, nela compreendido o manejo dos resíduos sólidos.

33 O Art. 6.º da Lei 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990, define as ações de vigilância epidemiológica, vigilância sanitária e vigilância em saúde do trabalhador como atribuição do SUS. Relacione o conceito com a respectiva vigilância.

- () Conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo o controle de bens de consumo e da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde.
- () Conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.
- () Conjunto de atividades que se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa à recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho.

A- Vigilância Sanitária.

B- Vigilância em Saúde do Trabalhador.

C- Vigilância Epidemiológica.

Assinale a resposta correta:

- a) B, C, D
- b) B, D, C
- c) A, B, C
- d) A, C, B
- e) C, B, A

34 Sobre os princípios do SUS é correto afirmar:

- a) A universalidade diz respeito à capacidade do sistema resolver a totalidade dos problemas de saúde dos usuários.
- b) A equidade representa a igualdade da assistência à saúde, sem discriminação ou privilégios de qualquer espécie.
- c) A regionalização refere-se à descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo.
- d) A integralidade é entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema.
- e) O controle social diz respeito à divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário.

35 O Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde- COAP objetiva a organização e a integração das ações e dos serviços de saúde, sob a responsabilidade dos entes federativos em uma Região de Saúde, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência aos usuários, através de acordo de colaboração entre os entes federativos para a organização da rede interfederativa de atenção à saúde. Assinale a alternativa que representa o instrumento legal do SUS que instituiu o COAP:

- a) Decreto 7.508, de 28 de Junho de 2001.
- b) Norma Operacional Básica do SUS/93.
- c) Lei 8.080 de 19 de Setembro de 1990.
- d) Portaria nº 399/GM de 22 de fevereiro de 2006- Pacto pela Saúde.
- e) Lei 8.142 de 28 de Dezembro de 1990.

36 Considerando a Lei 8.142 de 28 de Dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação popular no SUS, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, pelo Conselho de Saúde.
- b) O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, exceto nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão prerrogativa do chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo.
- c) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems) terão representação no Conselho Nacional de Saúde.
- d) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.
- e) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento próprio, aprovadas pelo respectivo conselho.

37 O Pacto pela vida, instituído pelo Pacto pela Saúde apresentado na Portaria Nº 399 de 22 de Fevereiro de 2006, representa o compromisso entre os gestores do SUS em torno de prioridades que apresentam impacto sobre a situação de saúde da população brasileira. Qual das alternativas abaixo não estava incluída no grupo de prioridades do Pacto em 2006?

- a) Saúde de Idoso.
- b) Saúde Mental.
- c) Promoção da Saúde.
- d) Fortalecimento da atenção básica.
- e) Controle do Câncer de colo de útero e mama.

38 Com relação às Normas Operacionais Básicas -NOB/91, NOB/93 e NOB/96 e a Norma Operacional da Assistência à Saúde-NOAS/2001 é correto afirmar:

- a) A NOB /93 propõe a transformação do modelo de atenção à saúde que deve ser centrado na qualidade de vida das pessoas e do seu meio ambiente, bem como na relação da equipe de saúde com a comunidade, especialmente com os seus núcleos sociais primários – a família.
- b) A NOB/91 instituiu novas formas de relação dos municípios com as esferas nacional e estadual estabelecendo três modalidades de gestão: Gestão Incipiente, Gestão Parcial e Gestão Semiplena.
- c) A NOAS/2001 teve como objetivo estabelecer o processo de regionalização como estratégia de hierarquização dos serviços de saúde e de busca de maior equidade.
- d) A NOAS/2001 instituiu uma nova lógica de financiamento para a atenção básica contribuindo para a expansão da Estratégia Saúde da Família no Brasil.
- e) O Plano Diretor de Regionalização e o Plano Diretor de Investimentos são instrumentos propostos na NOB/96.

39 As Comissões Intergestores são instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para definição das regras da gestão compartilhada do SUS. A Comissão Intergestores Tripartite – CIT é composta por:

- a) Representantes do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde – CONASS, do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde - CONASEMS e do Ministério da Saúde.
- b) Secretários Estaduais e Ministro da saúde.
- c) Representantes dos Conselhos Municipais de Saúde - CMS, das Secretarias Municipais- SMS e da Secretaria Estadual de Saúde - SES.
- d) Representantes do Conselho Estadual de Secretários Municipais de Saúde- COSEMS e da Secretaria Estadual de Saúde.
- e) Representantes do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde – CONASS, do Conselho Municipal de Saúde –CMS e do Ministério da Saúde.

40 O Decreto 7.508 de 28 de Junho de 2011, que regulamenta a Lei 8.080 de 19 de setembro de 1990, apresenta uma série de instrumentos para o reordenamento do Sistema único de Saúde. De acordo com as suas proposições assinale a alternativa INCORRETA:

- a) Para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços de atenção primária, de urgência e emergência, de atenção psicossocial, de atenção ambulatorial especializada e hospitalar e de vigilância em saúde.
- b) São Portas de Entrada às ações e aos serviços de saúde nas Redes de Atenção à Saúde os serviços de atenção primária, de atenção de urgência e emergência, de atenção psicossocial, os serviços especiais de acesso aberto e os Hospitais de Universitários.
- c) O acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde será ordenado pela atenção primária e deve ser fundado na avaliação da gravidade do risco individual e coletivo e no risco cronológico.
- d) O Mapa da Saúde será utilizado na identificação das necessidades de saúde e orientará o planejamento integrado dos entes federativos, contribuindo para o estabelecimento de metas de saúde.
- e) A Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde - RENASES compreende todas as ações e serviços que o SUS oferece ao usuário para atendimento da integralidade da assistência à saúde.

RASCUNHO